



6-Tioguanine

Andere namen: 6-TG, Lanvis.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Milde misselijkheid en braken
- Huidveranderingen (uitslag)

Bijwerkingen op langere termijn

- Zere mond en diarree door ontstoken mond- en darmslijmvlies
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes
- Leverbeschadiging

Speciale instructies

- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen braakt, overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Laat je kind de tablet(ten) voor het eten innemen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen ziet of als je kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.