



Ciclosporine

Andere namen: Sandimmune®, Neoral®.

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn dat gegeven wordt om afstotingreacties tegen te gaan of auto-immuunziekten te onderdrukken.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een drank of capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn

- Lever- en nierbeschadiging
- Verhoogde bloeddruk
- Tijdelijke toename van beharing op gezicht en lichaam en veranderingen in het gezicht, zoals dikke wangen
- Verhoogde kans op infectie, maagklachten, hoofdpijn
- Irritatie van de zenuwbanen met als gevolg een 'doof' gevoel en/of tintelende vingers en tenen
- Trillende handen
- Stuipen

Speciale instructies

- Geef de ciclosporine twee maal per dag, met gelijke tussenpozen.

- Roer ciclosporinedrank goed door een **glas** melk of vruchtensap (**geen** grapefruitsap) en laat je kind dit meteen opdrinken. Spoel het glas na met wat water en laat je kind dit ook opdrinken.
- Spoel de doseerspuit na gebruik niet schoon, maar veeg alleen de buitenkant af met een droge tissue.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft, geef dan de capsule of het drankje opnieuw.
- Als je het medicijn vergeten bent, geef het dan zo snel mogelijk alsnog. Doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla het innemen dan over en ga verder met het gewone schema.

Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de spiegel van ciclosporine te bepalen en om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.
- Je kind is extra gevoelig voor zonnebrand. Laat het daarom niet zonder petje en met blote armen en benen in de zon, en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.