



# Co-trimoxazol

Andere namen: Bactrimel<sup>®</sup>, Trimethoprim/sulfamethoxazol.

## Wat is het en hoe werkt het?

Een antibioticum dat gegeven wordt om een infectie te behandelen van infecties of om een longontsteking met pneumocystis carinii te voorkomen.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een drank of een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid, braken
- Diarree

## Bijwerkingen op langere termijn

- Huiduitslag, jeuk
- Buikpijn
- Leverbeschadiging en verminderde nierfunctie

## Speciale instructies

- Geef je de drank door de sonde, doe dit dan snel of verdun de drank met wat water om te voorkomen dat de sonde verstopt raakt.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft, geef dan de tablet of het drankje opnieuw.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen bij je kind ziet of als je kind over jeuk klaagt.