



Cyclofosfamide

Andere namen: Cyclo, Endoxan, CTX.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet of capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1 tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken (bij intraveneuze toediening)

Bijwerkingen op langere termijn

- Ontsteking van de blaas met bloederige urine
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies
- Donkere verkleuring van de huid (zeer zelden)

Speciale instructies

- Laat je kind dit medicijn bij voorkeur 's morgens innemen.
- Als je kind na het innemen binnen 30 minuten overgeeft, overleg dan met de verpleegkundige of het medicijn opnieuw gegeven moet worden.
- Laat je kind goed drinken en regelmatig plassen om irritatie van de blaas zoveel mogelijk te voorkomen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind pijn heeft bij het plassen en/of als er bloed in de urine zit.

Bijzonderheden

Je kind krijgt voor en na toediening extra vocht en Mesna (uromitexan) om blaasproblemen te voorkomen (afhankelijk van de dosering).