



Cytarabine

Andere namen: Cytosine-arabinoside, Cytosar, ARA-C, Alexan

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of langdurig als infuus gegeven wordt. Dit medicijn kan ook onder de huid (subcutaan) gespoten worden of via een lumbaalpunctie/Rickhamdrain (intrathecaal) gegeven worden (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Hoofdpijn na toediening via een lumbaalpunctie
- Rode en/of jeukende huid

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 10 dagen na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies
- Griepachtige verschijnselen zoals spierpijn, koorts en hoofdpijn

- Bij hoge doseringen irritatie van de ogen
- Haaruitval
- Leverbeschadiging

Speciale instructies

- Bij hoge doseringen kan je kind oogdruppels gebruiken om irritatie van de ogen te voorkomen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen bij je kind ziet of als je kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden

- Bij hoge doseringen kan de huid van de handpalmen en voetzolen loslaten.
- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.