



Dactinomycine

Andere namen: Actinomycine D, Lyovac Cosmegen.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een gele vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of als infuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Infecties
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt

Bijwerkingen op langere termijn

- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies (5 tot 10 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Diarree door ontstoken darmslijmvlies
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)

- Verkleuring of roodheid van de huid in (eerder) bestraald gebied
- Acné en/of huiduitslag
- Leverbeschadiging
- Spierpijn

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een brandend of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- De huid kan overgevoelig zijn voor bruine pleisters.

Bijzonderheden

Er wordt (afhankelijk van de dosering) regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.