



Daunorubicine

Andere namen: Daunomycine, Cerubidine®, Vyxeos® (dit is in combinatie met cytarabine)

Wat is het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit, en hoe wordt het gegeven?

Een rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1-4 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Okergeel tot roodverkleuring van de urine
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt.

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening).
- Zere mond, buikpijn en diarree als gevolg van ontsteking van het mond/ darm slijmvlies (1 tot 2 weken na toediening).
- Haaruitval
- Beschadiging van de hartspier (bij een hoge totale dosering)

- Lever- en nierbeschadiging
- Huidreactie van een (eerder) bestraald gebied
- Infecties
- Verkleuring huid en nagels

Speciale instructies

Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een brandend of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden

Je kind krijgt regelmatig een electrocardiogram (ECG) en/of echo van het hart.

Er wordt regelmatig bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.