



## Dexamethason

Andere namen: Decadron, Dexa.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een hormoon dat ook door het lichaam wordt aangemaakt. Het is ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties. In bepaalde gevallen kan het kankercellen doden en versterkt het de werking van bepaalde chemotherapie.

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) wordt gegeven (afhankelijk van het protocol).

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Branderig gevoel in de maag

### Bijwerkingen op langere termijn

- Toename van de eetlust, gewichtstoename en het vasthouden van vocht waardoor je kind een 'vollemaansgezicht' en een dikke buik kan krijgen
- Gedragsveranderingen, rusteloosheid, irritatie, agressief

gedrag, soms slapeloosheid en depressie

- Verhoging van de bloedsuikers en/of suiker in de urine
- Verhoogde bloeddruk
- Verminderde verschijnselen bij infecties
- Acné

### Speciale instructies

- Laat je kind de tabletten tijdens de maaltijd innemen met water of melk. Dit helpt tegen het branderige gevoel in de maag.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen van dit medicijn overgeeft, overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Door het gebruik van dexamethason kunnen infecties gemaskeerd worden.

### Bijzonderheden

- De bijwerkingen verdwijnen langzaam als de dexamethason wordt uitgesloten.