



## Fludarabine

Andere namen: Fludara.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als injectie of kortdurend infuus wordt gegeven.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Koorts en rillingen
- Misselijkheid en braken
- Diarree door ontstoken darmslijmvlies

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Vermoeidheid en algehele malaise
- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies

- Vasthouden van vocht
- Tintelende vingers en tenen en verminderde spierkracht in handen en onderbenen
- Wazig zien
- Huiduitslag

### Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je veranderingen aan de huid van je kind ziet, zoals uitslag, blaren, blauwe plekken of bloedingen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tekenen van een infectie heeft, zoals koorts en koude rillingen.
- Tijdens het gebruik van fludarabine mag je kind niet ingeënt worden. De behandelend arts kan er meer over vertellen.