



## Idarubicine

Andere naam: Zavedos®.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een oranje-rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Verkleuring van de urine, van roze tot rood 1-2 dagen na de toediening (kan een aantal dagen duren)
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Diarree door ontstoken darmslijmvlies

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
- Infecties
- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies (3 tot 10 dagen na toediening)
- Haaruitval

- Beschadiging van de hartspier bij hoge doseringen
- Leverbeschadiging
- Verkleuring van de huid van een (eerder) bestraald gebied

### Speciale instructies

Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

### Bijzonderheden

Je kind krijgt regelmatig een electrocardiogram (ECG) en/of echo van het hart.