



Irinotecan

Andere naam: SN-38.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een kleurloze tot lichtgele vloeistof die via een ader als infuus in 30-90 minuten wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Diarree, misselijkheid en braken
- Zweten
- Buikpijn
- Tranende ogen of problemen met zien
- Veel speekselvorming

Bijwerkingen op langere termijn

- Ernstige diarree
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
- Haaruitval
- Misselijkheid en braken
- Verstopping (obstipatie)
- Koort

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een brandend of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd direct zonlicht en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Sommige kinderen krijgen rondom de kuur met irinotecan een antibioticum om diarree te voorkomen of te verminderen.