



Naproxen

Andere naam: Aleve®.

Wat is het?

Een medicijn tegen koorts, pijn en ontsteking.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt gegeven.
- Een zetpil die via de anus (rectaal) wordt gegeven.

Bijwerkingen

- Maagklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, boeren, zuurbranden en (zeer zelden) gebrek aan eetlust
- Darmklachten, zoals winderigheid en (zelden) diarree en verstopping
- Hoofdpijn
- Slaperigheid, duizeligheid
- Huiduitslag
- Bloedstollingsproblemen

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als er bloed bij de ontlasting zit of als je kind bloed overgeeft.
- Het is belangrijk dit medicijn volgens schema te geven.

Bijzonderheden

- Omdat Naproxen wisselwerkingen kan hebben met andere medicijnen, raden we af het zelf bij de drogist te kopen.
- Als je kind Naproxen van de apotheek krijgt, wordt altijd gecontroleerd of je kind dit veilig kan gebruiken in combinatie met andere medicijnen die het krijgt.
- Heb je vragen over een wisselwerking van Naproxen met een medicijn, neem dan contact op met de apotheek.