



Procarbazine

Andere naam: Natulan.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken (gedurende 1 tot 6 uur)
- Huidveranderingen (uitslag, jeuk)

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (14 tot 18 dagen na toediening, gedurende 2 tot 3 weken)
- Tintelingen in vingers en tenen

Speciale instructies

- Laat je kind de capsule zittend of staand innemen zonder op de capsule te kauwen.
- Ben je vergeten dit medicijn te geven, dan mag je het binnen 12 uur alsnog geven. Als er meer dan 12 uur verstreken zijn, sla je de dosis over en geef je de volgende dag op het gewone tijdstip de gewone dosis.
- In combinatie met alcohol en bepaalde voedingsmiddelen (banaan, tomaat, yoghurt, kaas, chocolade, cola) kan dit medicijn reacties geven. Vraag daarom naar de dieetlijst.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen ziet of als je kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden

Vermijd bovengenoemde voedingsmiddelen.