



# Tacrolimus

Andere namen: Prograft, Advagraf, Modigraf.

## Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn dat het immuunsysteem onderdrukt en een afstotingsreactie na transplantatie tegengaat.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een doorzichtige vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Diarree, maag- en darmklachten

## Bijwerkingen op langere termijn

- Verhoogde bloeddruk
- Suikerziekte
- Hoofdpijn
- Slapeloosheid
- Nierfunctiestoornissen
- Verstoorde elektrolytenhuishouding

## Speciale instructies

- Laat je kind dit medicijn 1 uur voor of 2 tot 3 uur na de maaltijd innemen.
- Dit medicijn mag niet met grapefruit(sap) worden ingenomen, omdat dit de werking van het medicijn kan beïnvloeden.
- Vermijd de zon en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

## Bijzonderheden

Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te controleren of de dosering juist is en om bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken.