



## Temozolomide

Andere naam: Temodal.

### Wat is het en wat doet het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Verstopping (obstipatie)

### Bijwerkingen op langere termijn (afhankelijk van dosis)

- Verlaging van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
- Vermoeidheid

### Speciale instructies

- Temozolomide moet een uur vóór een maaltijd/sondevoeding ingenomen worden of anders ten minste twee uur erna.
- Laat je kind dit medicijn het liefst in zijn geheel met water innemen.

- Kan je kind dit niet, laat de capsule dan in een glas/medicijnbeker zacht worden in wat appelsap (30 ml) of appelmoes (30 gr) op kamertemperatuur. Dien de complete inhoud toe.
- Als je kind een sonde heeft, laat de capsule dan uiteenvallen in een spuit met 30 ml appelsap op kamertemperatuur.
- Als je kind na het innemen braakt, geef dan geen nieuwe dosis! Geef de volgende dag de normale dosis (dus niet inhalen).
- Ben je vergeten het medicijn te geven, geef het dan alsnog zo snel mogelijk (op dezelfde dag). Is dag al voorbij, dan sla je de dosis over (dus niet inhalen).

### Bijzonderheden

Geef je kind een kwartier voor het innemen een tablet tegen de misselijkheid.