



## Vindesine

Andere naam: Eldisine.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) in 1-3 minuten gegeven wordt.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken
- Koorts en koude rillingen

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes (3-5 dagen na toediening)
- Buikpijn, buikkrampen, verstopping (obstipatie)
- Irritatie van zenuwbanen, met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderde spierkracht in de onderbenen en de handen
- Haaruitval

### Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Let goed op de stoelgang van je kind.

### Bijzonderheden

Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of een laxeermiddel te geven.