



## Vinorelbine

Andere namen: Navelbine, Navirel.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een heldere, kleurloze tot lichtgele vloeistof die via een ader (intraveneus) in 6-8 minuten of als infuus in 20-30 minuten gegeven wordt.
- Een capsule die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken

### Bijwerkingen op langere termijn

- Buikpijn, buikkrampen, verstopping (obstipatie)
- Irritatie van zenuwbanen met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderende spierkracht in de onderbenen en de handen
- Haaruitval
- Infecties

### Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een brandend of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Let goed op de stoelgang van je kind.

### Bijzonderheden

Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of je kind een laxeermiddel te geven.