



Voriconazol

Andere namen: Vfend.

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn dat gegeven wordt om schimmelinfecties te voorkomen of te behandelen

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een suspensie of tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Bij inname van de tablet geen (sonde)voeding van 1 uur vóór tot 1 uur na inname.
- Bij inname van de suspensie geen (sonde)voeding van 2 uur vóór tot 1 uur na inname.
- Een heldere vloeistof die via een ader als infuus in minimaal 1 uur gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Pijnlijke huid of ontsteking op de plaats van toediening (bij perifeer infuus)
- Huiduitslag
- Verhoogde leverenzymen

Bijwerkingen op langere termijn

- Wazig zien
- Huiduitslag
- Verhoogde leverenzymen

Speciale instructies

De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de spiegel te bepalen. Je kind mag dan dit medicijn pas innemen na het bloed afnemen.