



Temozolomide

Andere naam: Temodal.

Wat is het en wat doet het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Verstopping (obstipatie)

Bijwerkingen op langere termijn (afhankelijk van dosis)

- Verlaging van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
- Vermoeidheid

Speciale instructies

- Temozolomide moet een uur vóór een maaltijd/sondevoeding ingenomen worden of anders ten minste twee uur erna.
- Laat je kind dit medicijn het liefst in zijn geheel met water innemen.

- Kan je kind dit niet, laat de capsule dan in een glas/medicijnbeker zacht worden in wat appelsap (30 ml) of appelmoes (30 gr) op kamertemperatuur.
- Als je kind een sonde heeft, laat de capsule dan uiteenvallen in een spuit met 30 ml appelsap op kamertemperatuur.
- Als je kind na het innemen braakt, geef dan geen nieuwe dosis! Geef de volgende dag de normale dosis (dus niet inhalen).
- Ben je vergeten het medicijn te geven, geef het dan alsnog zo snel mogelijk (op dezelfde dag). Is dag al voorbij, dan sla je de dosis over (dus niet inhalen).

Bijzonderheden

Geef je kind een kwartier voor het innemen een tablet tegen de misselijkheid.